

Guldsmid

QVÆSTIO MEDICA.

QVOD LIBETARIIS DISPUTATIONIBVS MANE DISCVTIENDA

IN SCHOLIS MEDICORVM DIE IOVIS XIII. DECEMBRIS.

M. NICOLAO PIETRE Doctore Medico Moderatore.

An ad extrahendum calculum diffcile ad pubem vesica?

821.



ALCVLVVS, qui vesicam diris diuexat cruciatibus, eâ dicitur quinquaginta eximendus est, omni ætate, quâvis anni tempestate, posthabita etiam cæli ratione. Optandum, vt atteri & comminui ille possit, atque eâ caliditate impetu excerneretur: at cum nihil exstet, quod id præstare valeat, vna vesicæ sectio calculo laboranti opitulari & subuenire potest: propterea Dicitur, hominum salutis studiosissimi, singulari consilio, vni omnium animantium homini ex alui sinu exstat vesica, & cum superiore, tam inferiore sui parte, quasi foras prodir, vt ita exposta facile dissecari posset in hominis solatium.



OMINI duntaxat appensa vesica est peritonæo, eoque duplicato quasi seculo concluditur, vnde cæteris visceribus illæsis, abdominis etiam cauo integro & intacto, cædi tutò in pube potest: mediâ sui parte demissa subter pubis ossa, ceruicæ suâ perinæum attingit: fundo verò ad pubem, imam ventris partem, elata, ea ipsa pubis ossa superat, digitos ferè tres; vt cathetere, paulatim incuruâ, attolli possit in pube ad sectionem, æquè commodè ac in perinæo: venis ab hypogastricâ prodeuntibus perfusa est plurimis, vt licet substantiâ omnino membranosa sit, cæsa tamen coëat & sanescat facili, non ceruicæ potius, quàm aliâ quâvis sui parte: nimirum sanguine ad quasque diuisas illius partes perque appellente, easque glutini instar connectente: præter adipem plurimum, qui priuata & suâ consistentiâ, non partis cuiusvis frigore, conefcitur, obdunduntur vesicæ, cum tendines membranosi musculorum abdominis, tum pyramidales musculi, qui ad eius fundum coëunt, at imâ sui parte discreti, quasi delignant & notant sectionis locum, si fortè dissecanda in pube sit vesica.



ISSECANDÆ ad pubem vesicæ, & ex eâ calculi eximendi, ratio perfacilis est, minimùmque operosa: Chirurgi manus in id erudita, suis pollens viribus, hoc opus omne administrat, & peragit: ecce, ægro supino iacente, diuersis cruribus ipsæque vinculo deuinctis, cathetere leuiter ab imo inflexo, & auerfa sui parte, eaque incuruâ, rescisso, attollitur vesica, & cultello, exactâ rite, dissecatur ad fundum vsque, amplo & patente vulnere: tum amouetur catheter, & Chirurgi manus alterutrius digitis, quasi oculatis, in vulnus indit, iustrantur vesicæ regiones omnes, & deprehensus calculus, nullo negotio, propter & celeriter extrahitur: si vesicæ ille adhæreat, cliso digitis glutine, nulla vi auellitur: quia si eam membrana sinum vesicæ faciat geminum & calculum contincat, is, tenui forcipis istu, discissa membranâ, digitis etiam educitur: atque hac arte nec diuelli nec discerpetur vesica, nec omnino aut minimùm contundetur: quod in vulneribus vesicæ potissimum est.



ISCISSA tantum vesicâ, leuioris momenti vulnus habetur & est: in vna angustij, quoru quisque dissectus fuit nullo vitæ discrimine? at vna cum vulnere, si collisa fuerit, deterius iam vulnus est, & sæpius lethale: vt vesicæ chirurgi calculi extractionem molientis præcipua laus sit, non solum curare, vt expedita sit sectio, & dolore minimo peragatur; sed imprimis studere, vt nullo periculo, nullo vesicæ damno, calculus educatur: geminum illud est, alterum dilaceratio, alterum contusio: alterutrum vel verum que si affuerit, conuolueretur inflammatio, breui extinctura tenuem vesicæ calorem.

ESICA ad pubem incisa, si plures subsint calculi, omnes extrahuntur, nec villus superesse poterit: sanguinis grumi, qui dum morantur, grauissimos inuehunt affectus, vna cum vrinâ per ductum vrinarium faciliè elabuntur: vulnus vrinâ non proluetur, quod ad vesicæ discissæ vniionem accelerandam facit plurimum: ita verò subiectum oculis vulnus est; vt & illius, & vesicæ vultu, chimo omnis explorata futura sit ratio: liberabitur æger tubulo illo, qui in vulnus quàm primùm immitti solet, turundâ etiam omni prælongâ, quæ duo cum adhibentur, dolorem mouent non leuem, diathesim inflammatoriam fouent, quietem ferè omnem adimunt; nec sordebit ille immundâ illuie, namque & alui omis pelui, & vrina matulâ commodè excipietur: licebit & mutare situm, modò que in dextrum, modò in sinistrum latus, gratâ vice decumbere: vno verbo, curatio longè facilior, & certior multo sanationis spes erit.

Ergo ad extrahendum calculum diffcile ad pubem vesica.

268.

Proponebat Lutetiæ PETRVS LE MERCIER Castrotheodoric. A.R.S.H.M.DC.XXXV.

DOMINI DOCTORES DISPUTATVRI.

M. Petrus Yuelin.
M. Petrus Richer.
M. Mathurin Deniau.

M. Franciscus le Vignon.
M. Ioannes de Cledat.
M. Claudius Quiquebeuf.

M. Claudius Gervais.
M. Franciscus Guenane.
M. Ioannes Merlet.

